

Cabinet dentaire du Dr Gregory BRUNG

Chirurgien Dentiste à ROUEN

96 rue du General Giraud - 76000 Rouen - Tél. : 02 35 72 51 33 - 02 35 70 13 84 - Fax : 02 35 88 73 48

<http://dr-brung-gregory.chirurgiens-dentistes.fr>

À L'ATTENTION PERSONNELLE DE _____

FICHE CONSEIL N° **6.01**

Rubrique : Les implants

La pose d'implant est possible dès l'âge de 18 ans


Les implants peuvent avoir une durée de vie de plusieurs dizaines d'années

Le titane est le matériau de choix en chirurgie implantaire car il associe une bonne compatibilité biologique à une bonne résistance mécanique

Qu'est-ce qu'un implant dentaire ?

Indications et contre-indications

Un implant dentaire est assimilable à une racine artificielle. Il se présente le plus souvent sous la forme d'une vis en titane placée dans l'os de la mâchoire. Il remplace la ou les racines d'une dent absente et sert de support pour réaliser une couronne, un bridge, prothèse amovible...



Quand pose-t-on un implant ?

Un implant peut être mis en place, soit immédiatement après l'extraction d'une dent, soit après la cicatrisation de l'os et de la gencive. L'acte chirurgical est souvent simple et peu douloureux. Il se fait sous anesthésie locale comme pour le traitement d'une carie.

La prothèse définitive est réalisée après la solidification de l'os autour de l'implant (dans un délai de 2 à 6 mois). Dans certaines conditions, une prothèse provisoire peut être mise en place immédiatement après la pose de l'implant.


Indications et contre-indications

Pour poser un implant, il faut que le volume et la qualité de l'os de la mâchoire soient suffisants. Ces paramètres sont généralement évalués à l'aide d'un scanner. Cependant il est aussi possible d'augmenter le volume osseux à l'aide d'une greffe osseuse. Il est également important que les dents voisines et la gencive soient saines.

Voir aussi : [Les greffes osseuses pré-implantaires](#)

Un questionnaire médical permettra d'écartier d'éventuelles contre-indications : irradiation de la face, haut risque d'endocardite infectieuse (infection d'une valve du cœur par des bactéries de la bouche).

Les contre-indications relatives sont plus fréquentes : mauvaise hygiène, tabac, diabète non équilibré, prise de médicaments anticoagulants...



Nos conseils

- L'implant permet de remplacer une ou plusieurs dents sans affecter les autres dents, et offre une prothèse à la fois fixe et confortable.
- Une seule dent absente peut déstabiliser toute la bouche. Si elle n'est pas remplacée, c'est le premier pas vers un processus de déchaussement ou d'édentation multiple.
- Si vous êtes concerné, vous devez, comme tous les porteurs d'implants, observer une hygiène dentaire extrêmement rigoureuse et effectuer des contrôles très régulièrement.